

דף הסבר להורים ולמטופלים בתרופות להפרעת קשב ופעלתנות יתר

שלום רב,


דף הסבר זה מיועד למטופלים ולהורי הילדים עבורם נרשם טיפול תרופתי בתכשירים המכילים מטילפנידייט - ריטלין, ריטלין SR, ריטלין LA, קונצרטא ודייטרנה (מדבקות) לטיפול בהפרעת קשב ופעלתנות יתר (ADHD).

רופא/ה מומחה/ית רשם/ה לך או לילדך, טיפול תרופתי להפרעת קשב ולפעלתנות יתר המכונה ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). התרופה נמצאת בשימוש נרחב בארץ ובעולם, ובשימוש עשיר שנים.

התרופות נחשבות לבטוחות ואחוז המטופלים הסובלים מתופעות לוואי קטן. יחד עם זאת, חשוב שתהיו מודעים לתופעות הלוואי ולהנחיות הבאות:

- 1 יש לעקוב אחר הגובה והמשקל בילדים בשל דיווחים של האטה מסויימת בעלייה של מדדים אלו בזמן הטיפול בריטלין.
- 2 התרופה יכולה לגרום לכאבי ראש, ירידה בתיאבון, כאבי בטן, ירידה במשקל, טשטוש ראייה, התנהגות חריגה, הפרעות שינה, עצבנות.
- 3 יש לדווח מיד לרופא/ה המטפל/ת על כל חרדה משמעותית, מתח, סערת נפש, מאחר ויכולה להיות החמרה לאחר לקיחת התרופה. כמו כן יש לדווח על הופעה או החמרה בטיקים (מוטוריים או קוליים).
- 4 יש לדווח מיד לרופא/ה המטפל/ת על החמרה או הופעה של תופעות פסיכיאטריות, כגון: הפרעת התנהגות וחשיבה, מחלה דו-קוטבית, התנהגות אגרסיבית או עוינות. ילדים ומתבגרים יכולים לחוות גם סימפטומים פסיכטיים (כגון שמיעת קולות) או סימפטומים מאניים.
- 5 יש לדווח מיד לרופא/ה המטפל/ת על מקרה עילפון, כאבים בחזה, דפיקות לב, קושי בנשימה או כל סימן אחר הקשור בלב.
- 6 יש להשתמש בכל תכשיר ריטלין על פי הוראות היצרן.
- 7 יש להימנע משתיית אלכוהול בזמן הטיפול בתרופה.
- 8 יש להימנע משימוש בתרופה שנקראת מעכב MAO (MAO inhibitor), 14 יום לפני התחלת השימוש בתכשירי מטילפנידייט (ריטלין ואחרים).

בברכת בריאות שלמה,



ד"ר מיכאל דוידוביץ

ממונה התפתחות הילד
אגף רפואה ראשונית
מכבי שירותי בריאות



פרופ' יעקב קוינע

מונהל תחום רפואת ילדים
אגף רפואה ראשונית
מכבי שירותי בריאות

